

STANDARDELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICA

	Cifrul	Nozologia	Durata (zile)	Investigații	Tratamentul	Doza (o dată)	Cantitatea
1.	M 87.0	Maladia Pertes	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe	4	
				Analiza biochimică a sîngelui	Placă metalică	1	
				ECG	Aparat gipsat	25-30	
				Radiografia	Tifon	20	
				Cons. Fizioterapeut	Vată	400,0	
				Scintigrafia osoasă	Pansamente	5	
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii	2	
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	10
					Plasmă	200 ml	
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil, ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole

					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
					Cui		1
2.	M 91.1	Epifizoliză juvenilă a capului osului femoral	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe		4
				Analiza biochimică a săngelui	Cui		1
				ECG	Aparat gipsat		25-30
				Radiografia	Tifon		20
				Cons. Fizioterapeut	Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii		2
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7 fl
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromurăde fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole

					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
					Cui		1
3.	Q 65.8	Coxa vara - Coxa valga	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe		4
				Analiza biochimică a săngelui	Cui		1
				ECG	Aparat gipsat		25-30
				Radiografia	Tifon		20
				Cons. Fizioterapeut	Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii		2
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7 fl
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5fiole

4.	O 76.3 Q 76.4	Scolioza și deformități ale coloanei vertebrale	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Fixator Cotrell - Debouset	1
				Analiza biochimică a săngelui	Alcool etilic 70%	300 ml
				ECG	Aparat gipsat	25-30
				Radiografia	Tifon	20
				Cons. Fizioterapeut	Vată	400gr
				TC	Pansamente	5
				RMN	Seringi	2 ml
				Scintigrafia pulmonară	Perfuzii	2
				USG Cord	Sol. Glucoză 5%	200 ml
				USG organelor interne	Cefazolină 1,0	1,0
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml
					Cefuroxim 0,75	0,75
					Seringi	5 ml
					Discus Compozitus fiole (homeopate)	2,2 ml
					Traumel S fiole (homeopate)	2,2 ml
					Metilprednisolon	500mg
					Traumel, pasta (homeopate)	50g
					Traumel, ung (homeopate)	50gr
					Sol Magneziu sulfat 25% -5ml	5ml
					Sol. Tiamină 5%-1ml	1 ml
					Sol. Piridoxină 5%-1ml	1 ml
					Sol. Acid Nicotinic 1%-1ml	1 ml
					Sol. Ergocalciferol 12 500 UI	1 ml
					Sol. Acid ascorbic 5%-2ml	2 ml
					Sol. Solcoseril	2 ml
						10 fiole

				Sol. Neostigmină 0,05%-1 ml	1 ml	10 fiole
				Sol. Inozină 2%-5ml	5 ml	10 fiole
				Sol. Piracetam 20%-5ml	5 ml	10 fiole
				Sol. Lidocaină 2%-2ml	2 ml	10 fiole
				Sol. Prednizolon 3%-1ml	1 ml	5 fiole
				Sol. Vinpocetină 0,5%-2ml	2 ml	10 fiole
				Sol. Furosemid 1%-2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Acetazolamidă 250 mg	comprimate	10
				Catetere periferice		10
				Sol. Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	4fl
				Cefuroxim 0,75	0,75	10fl
				Fluturașe		2
				Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
				Ceftazidim 1,0 (rezerva)	5ml	10 fiole
5.	Q 76.7, Q 76.8, Q 76.9	Deformitatea cutiei toracice	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml
				Analiza biochimică a săngelui	Tifon	5 m
				ECG	Aparat gipsat	10
				Radiografia	Tifon	10
				Spirografia	Vată	400gr
				Cons. Fizioterapeut	Pansamente	5
				USG Organelor interne	Seringi	5 ml
				TC 3D Cutiei toracice	Perfuzii	2
				USG Cordului	Sol. Glucoză 5%	200 ml
				Scintigrafia pulmonară	Cefazolină 1,0	1,0
				Consultația Cardiologului	Ceftriaxon 1,0	1,0
					Sol. Lincomycină 30%-1 ml	1ml
						10 fiole

				Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
				Plasmă	200 ml	
				Placa metalica		1
				Broșe		10
				Fixatoare		70
				Sol.Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenziverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
6.	Q66.0,Q 69.9	Picioare strâmb congenital	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	4
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	10
					Vată	200gr
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Broșe	1
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
						6 fiole

					Broșe		10
					Sol.Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg comprimate		3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10 fl
					Rezerva (Cefalosporina G III)		10 fl
					Paracetamol supp 80mg	80mg	10 supp.
					Paracetamol Suspenzie	2,5ml	1 fl
7.	Q68.0,	Torticolis muscular	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	5ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2 ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de	5 ml	5fiole

				sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml		
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
				Sol. Lincomicină 30%-1ml	1 ml	10fiole
8.	Q73.8	Ectromielie	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	15
					Tifon	10
					Vată	200gr
					Pansamente	5
					Seringi	20ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1 ml
					Aparat Ilizarov	6 fiole
					Broșe	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml

					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
9	Q71.3	Ectromielie	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomycină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Gentamicină 4%-2ml	2ml	10 fiole
10.	Q73.8	Ectromielie, aparatul Ilizarov	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat Ilizarov		
					Tifon		10

				Broșe		8
				Pansamente		5
				Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomycină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Gentamicină 4%-2ml	2ml	10 fiole
11.	Q 69. Q 70.0- Q 70.9	Sindactilii, polidactilii	11 zile			
				Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	2
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	1 ml
						5fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	pastile
					Troxerutin, ung 40,0	1
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1 tub
					Heparină ung 25,0	1
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	1tub
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	5fiole
					Sol. Lincomycină 30%-1 ml	2 ml
					Cefazolină 1,0	10 fiole
						1,0

					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
12.	D 16.0- D 16.9	Tumori benigne ale țesuturilor moi	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		200 gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
13.	D 16.0- D 16.9	Tumori osoase- rezectii marginale	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		

				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
				TC	Tifon		10
				Scintigrafia	Vată		200 gr
				RMN	Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung	1	1tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
14.	D 16.0- D 16.9	Tumori osoase- rezactii marginale cu aloplastie	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15

			TC	Tifon		10
			Scintigrafa	Vată		200 gr
			RMN	Pansamente		5
				Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
15.	Q 72.4, Q 75. Q72.6	Inegalitatea membrelor	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat Ilizarov	4 inele
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	10
					Broșe	8
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
						20

				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicină 30%-1ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
16.	Q 74	Maladia Madelung	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat Ilizarov	4 inele
					Tifon	10
					Broșe	8
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1 ml
					Sol.Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de	10 fiole
						5 ml
						5 fiole

				fенпиверинă 5 ml		
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
17	Q 74.0	Sinostoza radioulnară	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	5
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	10
					Broșe	4
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fенпиверинă 5 ml	5 ml	5fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	pastile	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub

				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10 fl
18	Q 78.9	Procese displastice-osteotomii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografie	Aparat gipsat	15
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	10
					Broșe	4
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate
					Troxerutin, ung 40,0	1
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1tub
					Heparină ung 25,0	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml
					Cefazolină 1,0	1,0
						10fl

					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
19	Q 74.1	Luxatiile patelei	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		20
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
20	Q 95.9	Deformații poliomielitice-tenotomii	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	

			ECG	Tifon	5 m	
			Radiografia	Aparat gipsat		20
			Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
				Vată		400gr
				Pansamente		5
				Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Broșe		10
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
21	Q 95.9	Deformități postosteomielitice și după poliomielită-osteotomii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	
						20

			Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
				Vată		400gr
				Pansamente		5
				Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Broșe		10
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
22	Q 95.9	Deformități postosteomielitice și după poliomielită-artrodeze triple a piciorului	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografie	Aparat gipsat	10
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	10

				Vată		400gr
				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Broșe		10
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
23	G 80.0- G 80.9	Paralizie cerebrală infantilă- tenoplastie	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Cons. Fizioterapeut	Aparat gipsat	15
					Tifon	10
					Vată	400gr
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1 ml
					Sol. Metamizol de	10 fiole
					5 ml	5 fiole

				sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml		
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
24	G 80.0- G 80.9	Paralizie cerebrală infantilă- ahiloplastie	11 zile	Analiza generală a săngelui		
				Analiza generală a urinei	Intervenția chirurgicală	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Anestezia	
				ECG	Alcool etilic 70%	100 ml
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	5 m
					Aparat gipsat	15
					Tifon	10
					Vată	400gr
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
					Sol. Lincomycină 30%-1 ml	1ml
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml
						5 fiole

				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
25	G 80.0- G 80.9	Paralizie cerebrală infantilă- osteotomii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Cons. Fizioterapeut	Aparat gipsat	30
					Tifon	10
					Vată	400gr
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml
					Broșe	10
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub

					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
26	Q 74.0 Q74.2 Q74.1 Q 74.8-	Deformități superioare și inferioare axiale a segmentelor și membrelor Alte deformatii ale membrelor	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		30
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		4
					Cui metalic		1
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub

				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
27	Q 65.5- Q 66.6	Deformitate plat valgus de picior	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon	10
					Vată	400gr
					Broșe	2
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1 ml
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	10 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	5 ml
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	2 ml
					Troxerutin, ung 40,0	comprimate
						3
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1 tub
					Heparină ung 25,0	1 tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	1 tub
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0
					Ceftriaxon 1,0	10fl

28	Q74.4	Ahondro-plazia	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% - 2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
29	Q78.0	Osteogeneza imperfectă-osteotomii	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	

			Radiografă	Aparat gipsat		10
				Tifon		10
				Vată		400gr
				Broșe		2
				Cui metalic		1
				Pansamente		5
				Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
30	M 79.2	Brahioplexită	11 zile	Analiza generală a sângeului	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon	10
					Vată	400gr
					Broșe	2
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
						20

				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
31	Q 74.3	Artrogripoză, picior strîmb	11 zile	Analiza generală a sângelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	4
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon	10
					Vată	200gr
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Broșe	1
					Intervenția chirurgicală	
					Anestezia	
					Alcool etilic 70%	100 ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
						6 fiole

				Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg comprimate	3	
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
32	Q 74.3	Artrogripoză, luxație de șold	11 zile	Analiza generală a sângeului		
				Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe	4
				ECG	Cui	1
				Radiografia	Aparat gipsat	25-30
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon	20
					Vată	400gr
					Pansamente	5
					Seringi	2 ml
					Perfuzii	30
					Sol. Glucoză 5%	2 ml
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	30
					Cefuroxim 0,75	2
					Sol. Baralgină	7fl
					Seringi	0,75
					Plasmă	10fl
					Sol. Metamizol de	5 ml
						5

				sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml		
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
33	Q 79.9	Pseudoartroze congenitale	11 zile	Analiza generală a sângelui Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG Tifon	5 m	
				Radiografia Aparat Ilizarov		
				Cons. Fizioterapeutului Tifon		10
				Scintigrafia osoasă Broșe		8
				RMN Pansamente		5
				TC Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml 2 ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml 1 ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicina 30%-1 ml 1ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml 2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml 2 ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg comprimate	3	
				Troxerutin, ung 40,0 1	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0 1	1	1tub

				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
34	M 25.9	Redoare posttraumatică a antebrațului-operații de reconstrucție	11 zile	Analiza generală a sângei Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Radiografia	Aparat gipsat	10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon	10
					Vată	400gr
					Broșe	2
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1 ml
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	10 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	5 ml
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	5 fiole
					Troxerutin, ung 40,0	3
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1
					Heparină ung 25,0	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	1tub
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml
						5fiole
						5 fiole

					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
35	M 20	Os tibialis extern	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		12
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
36	M 29	Hallus valgus	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	

			Radiografia	Aparat gipsat		12
			Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
				Vată		200gr
				Broșă		2
				Pansamente		5
				Seringi	2ml	20
				Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Lincomicina 30%-1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
				Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
				Broșă		10
37	M 20	Maladia Notta	3 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Cons. Fizioterapeutului	Aparat gipsat	20
					Tifon	5
					Pansamente	2
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	6 fiole

				Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
				Comp. Meloxicam 7,5 mg comprimate		3
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
38	T 23- T 24	Consecințele arsurii cu redoarea degetelor	11 zile	Analiza generală a săngelui	Intervenția chirurgicală	
				Analiza generală a urinei	Anestezia	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml
				ECG	Tifon	5 m
				Cons. Fizioterapeutului	Aparat gipsat	20
					Tifon	10
					Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	10
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	1 ml
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	6 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml
					Comp. Meloxicam 7,5 mg comprimate	5
					Troxerutin, ung 40,0	3
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1 tub
						1tub

				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
39	M 40 M 41 Q 76.3 Q 77.7 Q 65.8 Q 65.0 M 91.1 M 16	Patologia coloanei vertebrale și articulațiilor mari la tratament de recuperare				
				Analiza generală a sîngelui	Masaj	10
				Analiza generală a urinei	Parafină	10
				Cons. Fizioterapeutului	Electrostimulații	10
				Cons. Reabilitologului	Reduceri de subluxații	10
				TC	Exstenzii	10
				Spirografie	Gimnastica curativă	10
				Scintigrafie pulmonară	Masaj	10
					Parafină	10
					Electrostimulații	10
					Reduceri de subluxații	10
					Exstenzii	10
					Gimnastica curativă	10
					Masaj	10
	Q 65.8	Ablăția construcțiilor metalice	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Anestezia	
				Analiza generală a urinei	Alcool etilic 70%	100 ml
				Grupa sanguină, Rh-factor	Tifon	5 m
				ECG		10
				Radiografie	Pansamente	5
					Seringi	2ml
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml
						6 fiole

				Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
				Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5fiole
				Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5fiole
				Meloxicam 7,5 mg comprimate	3	
				Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
				Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
				Heparină ung 25,0	1	1tub
				Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
				Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
				Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl

NOTĂ Antibiotic de rezervă

Fortum 1gr. La consultăția medicilor specialiști examinarea adăugătoare și tratamentul indicat de specialist conform standartelor maladiei depistate.