

**STANDARDE
MEDICALE DE DIAGNOSTIC
ŞI TRATAMENT
UROLOGIE PEDIATRICĂ**

CIM Unitatea nozologic	Etapa acord-rii asis-ten ei medicale	Denumirea comun interna ional a investiga iilor	Num rul investiga iilor	Tratamentul: substanța /manopera	Doza unitatea de m sur	Numă rul de prize/ compr ille/ fiole/ flacon	Durata trat. recom.
Q 62 Hidronefroza				Sol.Metamizol 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml	50 % - 0,1 la 1 an de via , i/musc. 1 % - 0,1 la 1 an de via i/musc.,	2 fiole	1 zi
Q 60.1 Aghenezia renal bilateral	a) Urgen precipitateas că	Simptome clinice specifice maladiei: Anamneza: febr , 39-40, dureri lombare sau abdominale, piuri, hematurie sau tulbur ri de mic iune (polachiurie, disurie, jet urinar slab, incontinent , reten ie cronic de urin).				2 fiole	
Q 60.0 Agenezia renal unilateral							
Q 63.0 Rinichi dublu							
Q 63.8 Rinichi supranu-merar							
Q 60.3 Hipoplasia renal	b) medicală primară	Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a songelui, 2.Analiza general a urinei, 3.Echografic ilor urinare, rinichi, vezic urinar .	1 1 1	Sol. Dexametason 4mg/1ml. Sol. Metamizol 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml	4 mg i/musc 50 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1 % -0,1 ml la 1 an de via i/musc.	2 fiole	1 zi
Q 63.3 Rinichi hiper-trofic						2 fiole	
Q 61.0 Chist solitar renal						2 fiole	
Q 61.8 Chist renal multi-lacular							
Q 61.8 Rinichi multichistic (multichistoz)							
Q 63.3 Rinichi polichistic (polichistoz renal)	c) Specializat de ambulator	Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a songelui, trombocite . timpul de coagulare, 2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei, 4.Analiza biochimic a songelui(ureea,creatin,bilirub,gl ucoza,proteina totala) 5.Echografic ilor urinare, rinichi, vezic urinar , 6. ECG, 7. Analiza urinei Zimni kii, 8. Analiza Neciporencu, 9.Urocultura. 10. Cateterizarea vezicii urinare.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2-3	Sol. Metamizol sodic 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml Sol. Dexametason 0,4%/1ml 4 mg 1 ml i/musc.	50 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1 % -0,1 ml la 1 an de via , i/musc. 3 -5fiole 3 -5 fiole	3 -5 fiole	1 zi
Q 63.1 Rinichi “on potcoav ”							
Q 63.1 Rinichi discoid							
Q 63.1 Rinichi în form de “L”, “S”,“I”,							

	d) spitaliceasc	Q 62.1 Anoma-liile ureterale Q. 62.3 Urete-rocel Q 62.6 Ureter ectopic Q 62.1 Ureter retrocav	11.Computer tomografia cu vazografie 12.Renoscintigrafia dinamică renală 13.Urodinamica radionucleidă a ureterelor 14. USG sistemului urinar cu proba diuretică Investiga ii paraclinice: 1. Analiza general a songelui, trombocite timpul de coagulare 2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei, 4. Analiza biochimic a songelui, 5. Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar , 6. Echografie c ilor urinare cu diuretic, 7. ECG, 8. Analiza urinei Zemni kii, 9. Analiza Neciporencu, 10.Urocultura. 11. Urografie intravenoas , 12.Cistouretrografie, 13.Cistoscopia. 14. Cateterizarea vezicii urinare.	1	Sol.Metamizol 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml Sol. Dexametason 4mg/1ml.	50 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1 % -0,1 ml la 1 an de via , i/musc. 4 mg 1 ml i/musc.	3 -5fiole 3 -5 fiole 3-5 fiole	7
					Cefalosporine – genera ia II- III- IV (Cefasolini, Cefatrimi, Cefotaxim, Ceftazidim, Cefpirom), Metronidazol,	50 -100 mg kg/m i/musc.	2 flacoane	7 zile
					Penicilinile antipseudomonas Carbenicillina	7,5 mg kg/m i/musc.	1 flacon	7zile
					Nistatina	50-100 mg kg/m i/musc. 250.mii x 3 ori per os 2mg kg/m, 0,2 on sutc .		
					Fluconazol. Nitrofurane (Furagin, Furadonin)	60 mg kg/m Copii de la 2 ani pbn la 12 ani 0,25 x 3 ori pe zi. Copii mai mari de	4compr.	7zile
					Chinolone (Nevigra-mon, Gramurin, Palin).	12 ani 0,5 x 3 ori pe zi.	1 compr.ila	7 zile
					Ftiorchinoloane (Pefloxacin, Norfloxacin	10 mg kg/m, 5 mg kg/m, 10 mg kg/m,	3 compr.	7zile
					Ofloxacin Ciprofloxacin		3 compr.	7 zile
					Canephrone		3 compr.	7 zile
					Nocist Intensive			
					Nocist PREVENTE			
					Terapie de detoxicare:			3 zile

				Nocist Prevente (Sol.Dextran 40 Plasma, Glucoza Albumină Ser fiziologic mg kg/m, Interven ie chirurgicală : - Lumbotomia; - Heminefr-ureterectomia; - Nefrureterectomia; - Excizia chistului, - Opera ia Rovzing, - Heminefr-ureterectomia cu excizia uretero- celului. - Nefrureterectomia cu excizia ureteroceleului.	5-10 mg kg/m, 0,9 % - 5-10 mg kg/m). 10 mg kg/m	1flacoane 1 flacon 1flacon 1 flacon	7 zile
Q 64 Epispadia	Asistentă medicală primară	I. clinice specifice maladiei dehiscentă parietal sau completă a peretelui dorsal al uretrei Investigații paraclinice : an.gen./sonografie an. gen./urină termometrie	1 1 1	Sol. Dexametazon 4mg Sol. Metamizol sodic 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml	1ml 2ml 1ml	1-2 1-2 1-2	

		USG renichi + v/urinar Copilul se odreapt la consulta ia urologului (chirurg-pediatru) an.gen./songe+tromb+t/coagulare an.gen./urin gr./songe+Rh an. biochimic a songelui ECG USG sistemului urinar Consulta ia urologului Copilul se transfer on s/urologie a Centrului de Chirurgie Pediatric	1	Ceftazidim1.0 Zinacef 0.75 Ceftriaxon 1.0 Sol. Metamizol 50%-2ml Sol.Difenhidramin 1%-1ml Sol. Dexametazoni 4mg Praf.Xeroform	1gr 750mg 1gr 2ml 1ml 1ml 10gr	1 flacon 2 flacoane 3-4 fiole 2fiole 2 fiole 1 fiola	6 zile 6 zile 3zile 3 zile 3 zile
	Spitaliceasă	an.gen./songe+tromb+t/coagulare an.gen./urin gr./songe+Rh an. biochimic a s̄ngului coagulograma ionograma ECG USG organelor interne e a sistemului urinar TC Nefroscintigrafia dinamic Urografia i/v Urocultura +a/b grama	2	Ceftazidim1.0 Zinacef 0.75 Ceftriaxon 1.0 Metronidazol 500mg Furagin 0.05 5NOK 0.05 Mycosyst 50mg Sol.Glucozae 10% Sol.Glucozae 15% Sol. NaCl 0.9% Sol. Ac amynocapronici Sol. Aminofilin 2.4% SolAcid ascorbic5% Sol. Decinoni 12.5% Byseptoli Plenalgini Perfuzoare Seringi Seringi Seringi Alcool etilic 70% Praf Xeroform Fizioterapia	1.0gr 750mg 1.0gr 100ml 0.05 0.05 50mg 200ml 200ml 200-400ml 100ml 5ml 5ml 2ml 120-240mg 5.0ml 2-3 5ml 10ml 2ml 200ml 20gr	2flacoane 2flacoane 15 fl. 1flacon 30comp. 30comp. Scomp. 3-4fl. 3-4fl. 3-4fl. 1-2fl. 3-4fiole 3-4fiole 2-3fiole 4-5 fiole 2-3 20 10 10 5-7proceduri	10 zile 10 zile 4 zile
		Tratament chirurgical					
		1. Plastia uretrei (Kantwell and Thiarch) 2. Plastia uretrei i a colului v/urinare (Young-Dees sau V.Derjavin)					

		renale Tratament chirurgical <ol style="list-style-type: none"> 1) Reconstruc ia v/urinare 2) Deriva ia urinei on intestin Deriva ia urinei on segmentul intestinal izolat 	1	Byseptoli Sol. Decinoni 12.5% Sisteme de perfuzie Seringi Seringi Seringi Alcool etilic 70% Praf Xeroform Fizioterapia	5ml 5ml 120-240mg 2.0ml 5ml 10ml 2ml 200ml 20gr	5-6fiole 5-6fiole 10-20tab 3-4fiole 5-6 20 10 10	5-7proceduri
Q 54	Medicina primar	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa uretrei anterioare la diferite nivele. • Se manifest prin distopia meatului uretral i prin curbarea penian . • Poate fi : • H.glans penis(70%) • H. penian • H.scrotal • H. perinian • H. f r hypospadie • Copilul este ondreptat la consulta ia urologului sau chirurgului-pediatru. • an. gen. a songelui • an. gen. a urinei • an. biochimic a songelui • USG sistemului urinar <p>Consulta ia urologului.</p> <p>Copilul se transfer on sec ia urologie a Centrului de Chirurgie Pediatric</p> <ul style="list-style-type: none"> • an. gen a songelui+ • trombocite+t/coagul ri i • an gen a urinei • a biochimic a songelui+ionograma 					
	Condi ii specializat e de ambulator	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa uretrei anterioare la diferite nivele. • Se manifest prin distopia meatului uretral i prin curbarea penian . • Poate fi : • H.glans penis(70%) • H. penian • H.scrotal • H. perinian • H. f r hypospadie • Copilul este ondreptat la consulta ia urologului sau chirurgului-pediatru. • an. gen. a songelui • an. gen. a urinei • an. biochimic a songelui • USG sistemului urinar <p>Consulta ia urologului.</p> <p>Copilul se transfer on sec ia urologie a Centrului de Chirurgie Pediatric</p> <ul style="list-style-type: none"> • an. gen a songelui+ • trombocite+t/coagul ri i • an gen a urinei • a biochimic a songelui+ionograma 	1 1 1 1	Nitrofural Furigin Byseptol	400ml 0.05mg 120-240mg	2-3fl 21tab 15-20tab	3-7
	Spitaliceas c		1				8-12

		<ul style="list-style-type: none"> • gr de songe i Rh • ECG • R-grafia panoramic a sistemului urinar • Urografia i/venoas • an urinei Neciparenc • Nefroscintigrafia dinamic <p>Tratament chirurgical :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meato-plastia – on caz de stenoz meatal • Decurbarea penian • Excizia hordelor fibroase • Plastia suprafe ei ventrale a penisului cu formarea lamboului neouretrei. <p>3.Metode de tratament plastic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duplay – Savcenco • A.Sesil • Smith –Blackfield • Hodgston 1 i 2 • Roket-Young • On cazurile apari iei fistulilor uretrale – fistuloraphya cu plastia defectului cutan. 	1	Plenalgini Byseptol Furagin Sol. Metamizol 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml Praf xeroform Tifon Alcool etilic	5ml 240-480mg 0.05mg 2ml 1ml 20gr 4-6buc. 200ml	4-5fiole 20tab 20-30tab 4-5fiole 4-5fiole	
--	--	--	---	---	--	---	--

CIM Unitatea nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Denumirea comună internățională investigațiilor	Num rul investigațiilor	Tratamentul: substanța /manopera	Doza, unitatea de m sur	Num rul de prize/ compr./ fiole/ flacoane recomandat
N20.0 Litiază urinar (calcul renal) N 20.1 Litiază urinar (calcul ureteral)	a) Urgență prespitalicească	Sимптомы клинические специфичные для болезни: Анамнез: дolorи поясничные или животные, сильные, пароксистические, коликовые, с радиацией в нижнюю полую почку, рефлексы в промежности, животе, пупке, общая слабость, головные боли, температура тела, частые мочеиспускания, гематурия, нарушение мочеиспускания (полихиазия, олигурия, дисурия).		Tratamentul кишечных колик: 1. Ванна с теплой водой. 2. Противошоковая терапия. Сол. Метамизол 50%-2мл Сол. Дифенхидрамин 1%-1мл Сол. Баралгин	50 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1мл i/musc.	1 zi
N21.0 Litiază urinar (calcul al vezicii urinare, uretrei)	b) medicală primară	Исследования параклинического характера: 1. Анализ общего состояния больного, 2. Анализ мочи, 3. Эхография мочевого пузыря и мочевыводящих путей.	1	1. Ванна с теплой водой 2. Аналгезия: Сол.Метамизол 50%-2мл Сол. Дифенхидрамин 1%-1мл	50 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1 % - 0,1 la 1 an de via i/musc.	1 zi
	c) specializată de ambulator	Исследования параклинического характера: 1. Анализ общего состояния больного, 2. Тромбоэластограмма (тест коагулации).	1	Сол. Дексаметазон 4мг/1мл Сол. Баралгин Сол. Платифилин	4 mg i/musc 1 ml i/musc. 1 ml sub/cutan.	1 zi
			1	Сол.Метамизол 50%-2мл Сол. Дифенхидрамин 1%-1мл	50 % - 0,1 la 1 an de via i/musc. 1 % -0,1 ml la 1 an de via i/musc.	1 zi

	2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei, 4. Analiza biochimic a songelui, 5. Echografie c ilor urinar, rinichi, vezic urinar , 6. ECG, 7. Analiza urinei Zemni kii, 8. Analiza Neciporencu, 9. Urocultura. 10. Radiografie renovezical pe gol.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-2	Sol. Dexamethason 4mg/1ml Sol. Baralgin Sol. Platifillin Îndreptare la medicul urolog, chirurg pediatru.	4 mg i/musc. 1 ml i/musc. 1 ml sub/cutan	
d)spitalicească	Investiga ii paraclinice: 1. Analiza general a sanguinului, timpul de coag. 2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei, 4. Analiza biochimic a songelui, 5. Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar , 6. ECG, 8. Analiza urinei Zemni kii, 9. Analiza Neciporencu, 10. Urocultura 11. Urografie intravenoasă , 12. Cistourez-trografie, 13. Cistoscopia. 14. Ureteropielografie retrogradă în rinichi și urografie. 15. Scintigrafie renală . 16. Computer tomografie cu viziunea în situații când examinările radiologice nu sunt informative sau în asocierea altor patologii.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-2 1 1 1	Sol. Metamizol 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml Sol. Dexamethason 4mg/1ml Sol. Drotaverin Sol. Baralgin sol. Platifillin Cura de diureză în litiază urică : (aportul de lichide zilnic trebuie să asigure o diureză de cel puțin 2 litri). Se indică utilizarea produselor vegetale legume, fructe, cereale și moie. Litiază cistică : se reduce utilizarea produselor care conțin metionină, alcalinizarea urinării (pH 7,5). Se reduce apportul de alimente cu oxalat (ciocolată, ceaiul negru, coca, mere și altele). Litiază fosfată : acidificarea urinării prin administrarea	50 % - 0,1 ml la 1 an de via i/musc. 1 % -0,1 ml la 1 an de via , i/musc. 4 mg 1 ml 1 ml i/musc. 1 ml i/musc. 1 ml sub /cutan.	10 – 21 zile

				<p>proteinelor de origine animal (c r nuri). Se reduc produsele lactate.</p> <p>Tutukon</p> <p>Kanefron</p> <p>Piridoxin</p> <p>Tocoferol cu Vit A.</p> <p>Extracti Rubiae tinctorum siccum</p> <p>Urolesan</p> <p>Cefalosporine – genera ia II- III- IV (Cefasolini, Cefatrimi, Cefotaxim, Ceftazidim, Cefpirom), Metronidazoli,</p> <p>Penicilinile antipseudo-monas Carbenicillina Nistatina</p>	<p>flacon</p> <p>1 drage x 3 ori per os</p> <p>1 comp. x1 dat pe zi.</p> <p>1 drage x1 dat pe zi.</p> <p>1 comp.x3 ori pe zi.</p> <p>3- 4 pic turi pe zah r cu 30 min. onainte de mese, on colica renal 10 pic turi 3 ori pe zi.</p> <p>50-100 mg kg/m i/musc.</p> <p>0,5 % -100ml 250.mii x 3 ori per os</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Fluconazol.</p> <p>Nitrofurane (Furagin, Furadonin) Chinolone (Nevigra-mon, Gramurin, Palin).</p> <p>Ftorchino-loane (Pefloxacin, Norfloxacin</p> <p>Ofloxacin Ciprofloxacin</p> <p>Terapie de detoxicare: (Sol.Dextran 40</p> <p>Plasma, Albumin</p> <p>Ser fiziologic mg kg/m, Glucozae 5-10 %.</p> <p>Sol. Drotaverin 2%-1 ml i/musc. Sol. Baralgin 1ml i/musc.</p> <p>sol. Platifilin 2 % - 1 ml sub cutan.</p> <p>Interven ie chirurgical :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lumbotomia; - Pielolitotomia posterioar ; - Nefrolitotomia; - Nefrostomia; - Nefrureter-ectomia; - Ureterolitotomia; - Epicistolitotomia. 	<p>2mg kg/m, 0,2 on sutc .</p> <p>60 mg kg/m</p> <p>Copii de la 2 ani pbn la 12 ani 0,25 x 3 ori pe zi.</p> <p>Copii mai mari de 12 ani 0,5 x 3 ori pe zi.</p> <p>10 mg kg/m, 5 mg kg/m,</p> <p>5-10 mg kg/m,</p> <p>5-10 % - 5-10 mg kg/m).</p> <p>10 mg kg/m</p> <p>5-10 mg kg/m</p>	
--	--	--	--	--	--	--

CIM Unitatea nozologic	Etapa acor-d rii asis-ten ei medicale	Denumirea comun interna ional a investiga-riilor	Num rul investiga-riilor	Tratamentul: substan-a /manopera	Doza unitatea de m sur	Num rul de prize/ compr ille/ fiole/ flacon, lei	Durata trat. recom.
S 37,0 Leziunea traumatica a rinichiilor	a) etapa prespitaliceasc :			Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Plenalgin	50%-1-2 i/musc.	1 fiola	1 zi

	b) medicală primară	1. Investiga ii clinic specifice maladiei: dureri abdominale lombare,hematurie, peritonizm,masa tumoral lombar dureroas . 2. Investiga ii paraclinice: -an.generale a songelui, trombocite, -coagulograma, -an.generale urinei, -grupa de songe,Rh-factor, -USG organelor interne,rinichi i vezicii urinare. Consulta ia urologului -an.genrale a songelui, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe, Rh factor, -ionograma, -an.gen de urin , -USG repeatat, -urografie i/v, -Ondreptare pacientului in spital republican. -An.gen. de songe, trombocite, -coagulograma,		Sol.Baralgini Îndreptare la medic Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Plenalgini Sol.Baralgini Ondreptare la medic	50%-1ml-2ml i/musc. 1 fiola	1 zi
	c) Specializat de ambulator		1	Fortum Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Etamzilati Sol. Acid aminocapronic	1,0-2 ori 50%-1ml 2ml 5%	10-15 zile
	d) spitaliceasc	-gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -bilirubin,ALT,AST, -an.gen de urin , -ECG, -USG rinichiilor, -pielografie i/v, - computer tomografie cu vazografie -cistografie, -cistometria.	1	Fortum Zinacef 5NOC Amicacin Furagini Nivigramon Metranidazol Sol.Decinon S.Ac.Aminocap. S.Glucozae S.Aminofilin 1 S.Acid ascorbic Sol.Inosin	1,0-2 ori 750 mg-2ori 50mg-3 ori 1,0 0,05-2ori 50mg 100 mg 2ml ml 5%-100ml 5%,10%-400ml 2,4%-2ml 5%-2ml 2ml	20-30 20-30 30 compr. 20-30 compr. 30 compr. 30 compr. 5 5 5-6 5 5 5

		<u>Interven ia chirurgical :</u> -lumbotomia, -revizia rinichiilor, -suturarea rinichiilor, -nefroctomie.		Sisteme de perfuzie Seringi 10ml,2ml Alcool etilic 70 Canephrone Nocist Intensive	10ml,2ml 70 Drage plic	5-6 10-30 30 14	
S 37,2 leziunie a vezicii urinare	a) etapa prespitaliceasc : b) medical prim c) Specializat de ambulator	1.Investiga ii clinic specifice maladiei: <i>-Ruptura extraperitoneal</i> : dureri hipogastrice, mai ales la sforsul mic iezi, tenezma vezical, polachiuria,hematuria. <i>-Ruptura intraperitoneal</i> : dureri hipogastrice și dureri difuze,generalizate, contractura abdominală și ileus dinamic. 2.Investiga ii paraclinice: -an.generale a songelui, trombocite, -coagulograma, -an.generale urinarei, -grupa de sange,Rh-factor, -USG organelor interne,rinichi și vezicii urinare. Consulta la urologului -an.genrale a songelui, trombocite, -coagulograma, -gr.de sange,Rh-factor, -an.gen de urină, -USG rinichiilor și vezică urinare -Ondreptare pacientului în spital -An.gen. de sange, trombocite,	1 1 1	Sol.Metamizol 50%-2ml Furagini Sol.Baralgini Ondreptare la medic Sol.Metamizol 50%-2ml Furagini Sol.Baralgini Ondreptare la medic Fortum Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Etamzilati Furagini	1ml- 50% 0,05 1ml- 50% 0,05 10 2 3 20	10-14 zile	

	d) spitaliceasc	<ul style="list-style-type: none"> -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -bilirubin,ALT,AST, -an.gen de urin , -ECG, -USG rinichiilor, -cistografie mic ional -introduce sonda, <p><u>-Interven ia chirurgical</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - revizia v.urinare, suturarea rupturii. 	1 1 1 1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Fortum Zinacef 5NOC Amicacin Furagini 0,05 Sol.Etamzilati S.Glucozae S.Acid ascorbic5%-2ml Sol.Inosin 2ml Sisteme de perfuzie Seringi Alcool etilic 70 	<ul style="list-style-type: none"> 1ml-2 ori 750 mg-2ori 50mg, 1,0, 0,05 2 ml 5%,10% -200ml 5%-5ml 2ml 10ml,2ml 70 	<ul style="list-style-type: none"> 20-30 20-30 30 20-30 30 -40, 5 5 5 5 5 10-30 	
S 37,3 Leziunea uretrale	a) prespitaliceas b) medical primar c) Specializat de ambulator	<p>1. Investiga ii clinic specific maladiei: uretroragie, oc traumatica. Reten ie de urin , hematom peritoneal i subvezical.</p> <p>2. Investiga ii paraclinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -an.generale a songelui, trombocite, -coagulograma, -an.generale urinei, -USG organelor interne, rinichi i vezicii urinare. Consulta ia urologului. -an.genrale a songelui, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -an.gen de urin -USG rinichiilor, -Punc ia v.urinare suprapubiana -Ondreptare pacientului on spital republican -An.gen. de songe, trombocite, 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Sol.Metamizol 50%-2ml Furagini Ondreptare la medic Sol.Metamizol 50%-2ml Furagini Ondreptare la medic Fortum Furagini Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Etamzilati Sol. Acid aminocapronic Sol.Trimiperidin 	<ul style="list-style-type: none"> 50%-1ml 0,05 50%-1ml 0,05 1,0-2 ori 0,05 50%-1ml 2 ml 5% 1%-1ml 	<ul style="list-style-type: none"> 1 fiola 1 fiola 20 20 1 5 5 2-3 	14 -21 zile

	d) spitaliceasc	<ul style="list-style-type: none"> -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -bilirubin,ALT,AST -an.gen de urin , -ECG -USG rinichiilor -urografie retrograd -radiografie oaselor bazinului. <p>Interventie chirurgicala</p> <p>Cistostomă Sutura primara a uretrei sau sutura primara amînată (a 2-3 zi)</p>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Sol.Trimiperidin Sol.Metamizol 50%-2ml Fortum Amicacin Furagini 5-NOC Sol. Glucozae Sol. Na.Cl Sol.Acid ascorbic Inosin S.Ac.Aminocapronici Sisteme de perfuzie Seringi 	<ul style="list-style-type: none"> 1%-1ml 50%-1ml 1ml 1,0 0,05 50 mg 5%,10%- 200ml 0,9%-200ml 5%-2ml 2 ml 5%-100ml 10ml,2 ml 	<ul style="list-style-type: none"> 2-3 5-6 20-30 20-30 30 30 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 10-30 	
Q62,2 Reflux vezicouretra 1 (RVU) Protocol Clinic National Megaureter obstructiv	a) etapa prespitaliceasc :	<p>1.Investiga ii clinic specific maladiei: anamneza:febra, dureri in abdomen, dizurie</p> <p>2.Investiga ii paraclinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -termometria, -an.gen. de songe, -an.generale urinei, -an.urinei(proba Neciporencu), -Ecografie sistemului urinar. -an.genrale a songelui, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -an.gen de urin , -USG repeatat. -Ondreptare pacientului in spital republican. 					
	b) medical primar	<ul style="list-style-type: none"> -an.gen. de songe, -an.generale urinei, -an.urinei(proba Neciporencu), -Ecografie sistemului urinar. -an.genrale a songelui, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -an.gen de urin , -USG repeatat. 	1 1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Difenhidramin 1%-1ml Sol. Dexametazoni 	<ul style="list-style-type: none"> 50%-1ml-2ml 1%-1ml-2ml 1ml 	<ul style="list-style-type: none"> 1 fiola 1 fiola 1 fiola 	2-3 zile
	c) Specializat de ambulator	<ul style="list-style-type: none"> -An.gen. de songe, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -an.gen de urin , -USG repeatat. -Ondreptare pacientului in spital republican. 	1 1 1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Fortum Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Difenhidramin 1%-1ml Sol.Dexametazon 	<ul style="list-style-type: none"> 1,0-2 ori 50%-1ml 1%-1ml 4 mg-1ml 		10-14 zile
	d) spitaliceasc	<ul style="list-style-type: none"> -An.gen. de songe, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, 	1 1	<ul style="list-style-type: none"> Fortum Zinacef Metranidazoli 	<ul style="list-style-type: none"> 20-30 20-30flac 1,0 gr 	<ul style="list-style-type: none"> 3-4 	

		-bilirubina,ALT,AST, -ECG, -USG rinichiilor, -pielografie i/v, -cistografie, -cistoscopia, -cistomanometria, -urocultura, - computer tomografie cu vazografie - renoscintigrafia dinamică renală - urodynamică roadiouneidă a ureterelor -USG sistemului urinar cu proba diuretică	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1	Furagini Nistatini Nevigramoni Gramurin Sol.Glucozae Sol.Na Cl S.Ac.Aminocapron. Sol.Aminofilin 1 Sol.Acid ascorbic Sol.Inosin Sisteme de perfuzie Seringe 10ml, 2 ml Alcool etilic 70	750 gr 500 mg 0,05 500000 50mg 25 mg 5%,10%-400ml ml 0,9%-400ml 100ml-5% 5ml-2,4% 5ml 2ml 10-30 4-5	30 compr. 20-30 compr. 30 compr. 30 compr. 5-6 flac 5-6flac 2-3 fiole 5 fiole 5 fiole 5 fiole 4-5 100.0	
		Opera ii plastice dup procedeul Gregoir, uretrocistoanastomoz procedeul Mebel Cohen.	1124	Canephrone Nociste Intensive	Drage plic	30 14	
N 28 Paranefrita	a) etapa prespitaliceasc :	1. Investiga ii clinic specifice maladiei: anamneza:febra 39-40, fiori, dureri lombare, scoliozacu curbura spre locul afectat, toxiciza, exicoza. 2. Investiga ii paraclinice: -termometria, -an.gen. de songe, -an.generale urinei, -USG organelor interne, rinichi i vezicii urinare. Ondreptare la urolog.		Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Difenhidramin 1%-1ml Sol. Dexametazoni	50%- 1ml-2ml 1%-1ml-2-0 4mg-1ml	1 fiola	
N 15 Abces renal	b) medical primar		1 1 1			1 fiola 1 fiola	
	c) Specializat de ambulator	-an.genrale a songelui, trombocite, -coagulograma, -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -an.gen de urin , -USG repeatat,	1 1 1 1 1 1	Sol.Merkacin 100mg,200mg,500 mg/2ml Fortum Sol.Metamizol 50%-2ml Sol.Difenhidramin Sol.Dexametazoni	7,5mg la kg/m Χ 2 ori 1,0-2 ori 50%-1ml 1% 4 mg	1 fl. 10-20 fl. 10-20 fl. 10-20 fl. 10-20 fl.	7-10 1-2 zi

		-urografia i/v -Ondreptare pacientului on spital republican. -An.gen. de songe, trombocite, -coagulograma, -an.gen de urin , -gr.de songe,Rh-factor, -ionograma, -bilirubina,ALT,AST, -ECG, -USG rinichiilor, -pielografia i/v, -tomografie computarizata. On timpul opera iezi luarea exudatului la nesemon are.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fortum Zinacef Metranidazoli Mercacin Furagini Nistatini Sol.Glucozae Sol.Na Cl S.Ac.Aminocapron. Sol.Aminofilin Sol.Acid ascorbic Sol.Inosin Sisteme de perfuzie Serinnge Alcool etilic 70	1,0 gr 750 gr 500 mg -100 ml 0,05 500000 5%,10%-400ml ml 0,9%-200ml 5%-100ml 2,4%-5ml 5%-5ml 5ml 10ml, 2 ml	20-30flac 20-30flac 3-4 30 compr. 20-30 compr. 5-6flac 10-12 flac 3-4 flac 5-6 fiole 5-6 fiole 5-6 fiole 4-5 10-30 4-5	10-14 zile
d) spitaliceasc		Interven ia chirurgicale: lumbotomia, revizia rinichiului					

CIM Unitatea nozologic	Etapa acord. asist. medicale	Denumirea comun interna ional a investiga iilor	Nr. invest iga il or	Tratamentul substan a manopera	Doza unit ii de m sur	Nr. de prize, compr., fiole, flacoane	Durata tratament .recoman dat
Q 53,1 Q 53,2 Criptohidia – absen a permanent uni- sau bilateral a testiculului on scrot	Medicina primar	Investiga iile clinic specifice maladiei Lipsa testiculului on scot Investiga iile paraclinice Termometria Analiza general a songelui Analiza general a uirinii Fecalii la helmin i Ondreptare le urolog pediatru	1 1 1				1
	Specializat de ambulator	Analiza general a songelui, trombocite, timpul coagul rii Analiza general a urinii Gr. singe i Rh factor ECG Fecalii la helmin i Ondreptare la urolog pediatru	1 1 1 1				1
	Spitaliceasc	Analiza general a songelui, trombocite, timpul coagul rii Analiza general a urinii Gr. singe i Rh factor ECG Fecalii la helmin i	1 1 1 1	chirurgicala Interven ie cabororea testiculului on scrot, orhiopexia	Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml Cefazolini 1,0	fiole fiole flac.	3 3 10
N43	Medicina	Investiga ii clinice specifice maladiei	1 1 1				

CIM Unitatea nozologic	Etapa acord. asist. medicale	Denumirea comun interna ional a investiga ilor	Nr. invest iga il or	Tratamentul substan a manopera	Doza unit ii de m sur	Nr. de prize, compr., fiole, flacoane	Durata tratament .recoman dat
Hidrocelul se produce printr-o acumulare de lichid peritoneal sau vaginala testicular Funiculocele	primar	Mărirearea dimensiunii a hemisrotului pe partea bolnav Investigările paraclinice Termometrie Analiza generală a sangelelor Analiza generală a urinii Fecalii la helminți Ondreptare la urolog pediatru					1
	Specializat de ambulator	Analiza generală a sangelelor, trombocite, timpul coagулării Analiza generală a urinii Gr. sange și Rh factor ECG Fecalii la helminți Ondreptare la urolog pediatru	1 1 1 1 1 1	Interven ie chirurgical excizia procesului vaginal după 3 ani Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml Cefazolini 1,0	fiole Fiole flac.	3 3 10	1
	Spitaliceasc	Analiza generală a sangelelor, trombocite, timpul coagулării Analiza generală a urinii Gr. sange și Rh factor ECG Fecalii la helminți		Interven ie chirurgical : excizia procesului vaginal Pr.Rosse Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml	fiole flac.	3 10	

CIM Unitatea nozologic	Etapa acord. asist. medicale	Denumirea comun interna ional a investiga iilor	Nr. invest iga iil or	Tratamentul substan a manopera	Doza unit ii de m sur	Nr. de prize, compr., fiole, flacoane	Durata tratament .recoman dat
IM Unitatea nozologic	Etapa acord. asist. medicale	Denumirea comun interna ional a investiga iilor	Nr. invest iga iil or	Tratamentul substan a manopera	Doza unit ii de m sur	Nr. de prize, compr., fiole, flacoane	Durata tratament .recoman dat
N47 Fimoza reprezent ongustarea congenital sau dobondit a inelului prepu ial care face imposibil decolatarea glandului	Medicina primar	Investiga ii clinice specifice maladiei Ongustarea sau cicatrizarea orificiului pielii sacului prepu ial Investiga iile paraclinice Termometria Analiza general a songelui Analiza general a urinii Fecalii la helmin i Ondreptare le urolog pediatru	1 1 1				1
	Specializat de ambulator	Analiza general a songelui, trombocite, timpul coagul rii Analiza general a urinii Gr. singe i Rh factor ECG Fecalii la helmin i Ondreptare le urolog pediatru	1 1 1 1 1	Circumcizio Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml Cefazolini 1,0	fiole Fiole flac.	3 3 10	1
	Spitaliceasc	Analiza general a songelui, trombocite, timpul coagul rii Analiza general a urinii Gr. singe i Rh factor ECG Fecalii la helmin i	1 1 1 1 1	Circumcizio Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml Cefazolini 1,0	fiole Fiole flac.	3 3 10	

CIM Unitatea nozologic	Etapa acord. asist. medicale	Denumirea comun interna ional a investiga ilor	Nr. invest iga il or	Tratamentul substan a manopera	Doza unit ii de m sur	Nr. de prize, compr., fiole, flacoane	Durata tratament. recomand at
Sindrom « scrot acut »	Medicina primar	Investiga ii clinice specifice maladiei M rimea on volum a hemiscrotului Hiperemie, edimaciere, durere Investiga iile paraclinice Termometria Analiza general a songelui Analiza general a urinii Fecalii la helmin i Ondreptare le urolog pediatru	1 1 1 1				1
	Specializat de ambulator	Analiza general a songelui, trombocite, timpul coagul rii Analiza general a urinii Gr. singe i Rh factor ECG Fecalii la helmin i Ondreptare le urolog pediatru	1 1 1 1	Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml Cefazolini 1,0	fiole fiole flac.	3 3 10	1
	Spitaliceasc	Analiza general a songelui, trombocite, timpul coagul rii Analiza general a urinii Gr. singe i Rh factor ECG Fecalii la helmin i La recidiva orhioepididimitei – cistogramia micțională	1 1 1	<u>Detorsia testicolului</u> <u>Onl turarea hidatidei</u> <u>Morgani</u> <u>Orhioectomy</u> Sol. Metamizol 50%- 2ml Sol.Difenhidramin 1%- 1ml Cefazolini 1,0	fiole fiole flac.	3 3 10	7-10

CIM Unitatea nozologic	Etapa acor-d rii asis-ten ei medicale	Denumirea comun interna ional a investiga iilor	investiga iilor	Tratamentul: substan a /manopera	Doza unitatea de m sur	prize/compr.ille/fiole/flacon, lei	Durata trat. recom. zile
Q 64.2 Valva uretrei posterioare	Medicin primar	Investiga ii paraclinice: 1.An-za gen.songelui, 2.An-iza gen. urinei, 3.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar . Ondreptare la urolog- pediatru	1 1 1	Sol.Metamizol 50%-2ml Sol. Difenhidramin 1%-1ml - i/m., Sol. Dexametha-soni 4 mg i/m.	0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via	1fiol. 1fiol. 1fiol.	1
Q 64.3 Stenoza uretrei posterioare							
Stenoza uretrei distale							
Stenoza meatal							
	Specializat de ambulator	Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a songelui, tromb. timpul de coagulare, 2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei. 4.Analiza biochimic a songelui 5.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar 6.ECG 7.Analiza urinei Zemni kii 8.Analiza Neciporenc. Ondreptare la urolog- pediatru	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sol.Metamizol 50%-2ml i/m. Sol. Difenhidramin 1%-1ml - i/m., Sol. Dexamethasoni 4 mg i/m.	0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via	1fiol. 1fiol. 1fiol.	1
		Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a					

	Spitaliceasc	<p>songelui, tromb. timpul de coagulare</p> <p>2.Grupa de songe Rh factor,</p> <p>3.Analiza general a urinei,</p> <p>4.Analiza biochimic a songelui,</p> <p>5.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar ,</p> <p>6.ECG,</p> <p>7.Analiza urinei Zemni kii,</p> <p>8.Analiza Neciporencu,</p> <p>9.Urocultura</p> <p>10.Urografia intravenoas ,</p> <p>11.Cistoure-trografia,</p> <p>12.Cistoscopia.</p> <p>13 Calibrarea uretrei.</p>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<p>I. Tratament chirurgical:</p> <p>1.<u>Uretrotomia transuretral posterioar .</u></p> <p>3. Meatoplastia</p> <p>II. Tratament medicamentos</p> <p>Cefalosporine – gen. II- III-IV</p> <p>Metronidazol</p> <p>Nistatina</p> <p>Nitrofurane (Furagin, Furadonin)</p> <p>Chinolone (Nevigramon, Gramurin, Palin).</p> <p>Instila ia v.urinare cu</p> <p>Dioxidin 1%</p>	50 -100 mg kg/m 7,5 mg kg/m 125000- 500000 um 5- 8mg/kg/zi 60mg/kg/z i 10 ml	21 fl 21 compr. 28 compr. 21 compr. 21 compr. 10 fiol	7 7 7 7 7 10
Q 64.6 Diverticul al vezicii urinare	Medicin primar	Investiga ii paraclinice:	1 1 1	Sol.Metamizol 50%-2ml i/m. Sol. Difenhidramin 1%-1ml - i/m.,	0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1	1 fiol 1 fiol	1

		urinare, rinichi, vezic urinar Ondreptare la urolog-pediatru		Sol. Dexametha-soni 4 mg i/m.	an de via 0,1 ml la 1 an de via	1 fiol	
	Specializat de ambulator	Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a songelui, tromb. timpul de coagulare, 2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei. 4.Analiza biochimic a songelui 5.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar 6.ECG 7.Analiza urinei Zemni kii 8.Analiza Neciporencu	1 1 1 1 1 1 1 1	Sol.Metamizol 50%-2ml i/m. Sol. Difenhidramin 1%- i/m., Sol. Dexamethason 4 mg i/m. Cefalosporine – gen. II- III-IV Metronidazol Nistatina Nitrofurane (Furagin, Furadonin) Chinolone (Nevigramon, Gramurin, Palin).	0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via 50 -100 mg kg/m 7,5 mg kg/m 125000- 500000 um 5- 8mg/kg/zi 60mg/kg/z i	1 fiol 1 fiol 1 fiol 1 fiol 3 fl 3 compr.. 4 compr. 3 compr.. 3 compr..	1
	Spitaliceasc	Ondreptare la urolog-pediatru Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a songelui, tromb. timpul de coagulare 2.Grupa de songe Rh factor, 3.Analiza general a urinei, 4.Analiza biochimic a songelui, 5.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar ,	1 1 1	I. Tratament chirurgical: <u>Diverticulectomia</u> II. Tratament medicamentos Cefalosporine – gen. II- III-IV Metronidazol Nistatina	50 -100 mg kg/m 7,5 mg kg/m 125000-	30fl. 21compr.. 40 compr..	10 7 10

		<p>6.ECG, 7.Analiza urinei Zemni kii, 8.Analiza Neciporencu, 9.Urocultura 10.Urografia intravenoas , 11.Cistoure-trografie, 12.Cistoscopia.</p>	<p>1 1 1 1 1 2-3 1 1 1 1 1 1</p>	<p>Nitrofurane (Furagin, Furadonin) Chinolone (Nevigramon, Gramurin, Palin). Ftorchinoloane (Pefloxacin, Norfloxacin Ofloxacin Ciprofloxacin)</p> <p>Terapie de detoxicare: (Sol.Dextran 40 Plasma,Albumin NaCl 0,9%, Glucozae 5-10 %.</p> <p>Sol.Metamizol 50%-2ml i/m. Sol. Difenhidramin 1%-1ml 1 i/m., Sol. Dexamethason 4 mg i/m. Etamsilat 12.5% Acid ascorbic 5% Inosin</p>	<p>500000 um 5- 8mg/kg/zi 60mg/kg/z i</p> <p>50mg/kg/z i</p> <p>100-200ml 100-200ml 100-400ml 100-400ml</p> <p>0,1 ml la 1 an de via</p> <p>0,1 ml la 1 an de via</p> <p>0,1 ml la 1 an de via</p> <p>2 ml 1-2 ml</p>	<p>30 compr.. 21 compr..</p> <p>21 compr..</p> <p>3 fl. 3 fl. 3-6 fl. 3-6 fl.</p> <p>4-6 fiol.</p> <p>4-6 fiol. 4-6 fiol.</p> <p>4-6 fiol.</p> <p>3 fiol 3 fiol.</p>	<p>10 7 7 2-3 2-3 2-3 2-3 3</p>
I 86.1	Varicocelul	Medicin primar	Investiga ii paraclinice: 1.An-za gen.songelui, 2.An-iza gen. urinei, 3.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar . Ondreptare la urolog-pediatru Investiga ii paraclinice: 1.Analiza general a songelui, tromb. timpul de coagulare, 2. Grupa de songe Rh factor, 3. Analiza general a urinei. 4.Analiza biochimic a songelui 5.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar 6.ECG	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1
		Specializat de ambulator					1

	Spitaliceasc	<p>Ondreptare la urolog- pediatru</p> <p>Investiga ii paraclinice:</p> <p>1.Analiza general a songelui, tromb. timpul de coagulare,</p> <p>2. Grupa de songe Rh factor,</p> <p>3. Analiza general a urinei.</p> <p>4.Analiza biochimic a songelui</p> <p>5.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar</p> <p>6.ECG</p> <p>7. Urografia intravenoas</p>	1 1 1 1 1 1 1	<p>I. Tratament chirurgical: rezec ia venei</p> <p>testiculare procedeu Ivanisevici.</p> <p>II. Tratament medicamentos</p> <p>Baralginum</p> <p>Sol.Metamizol 50%-2ml i/m.</p> <p>Sol. Difenhidramin 1%-1ml i/m.</p> <p>, Sol. Dexamethasoni 4 mg i/m.</p>	5 ml. 0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via 0,1 ml la 1 an de via	4 fiol. 4 fiol. 4 fiol. 4 fiol.	2 2 2 2
N 31.1 Vezic urinar neurogen hiperreflectorie	Medicin primar Specializat de	<p>Anamneza: incontinen nocturn , diurn , mixt , enurezis, disurie.</p> <p>Investiga ii paraclinice:</p> <p>1.An-za gen.songelui, 2.An-iza gen. urinei, 3.Echografie c ilor urinare, rinichi, vezic urinar</p> <p>Ondreptare la urolog- pediatru</p> <p>Investiga ii paraclinice:</p> <p>1.Analiza general a</p>	1 1 1				1

Spitaliceasc	<p>Investigării paraclinice:</p> <p>1.Analiza generală a songelui, tromb. timpul de coagulare 2.Grupa de sânge Rh factor, 3.Analiza generală a urinăi, 4.Analiza biochimică a songelui, 5.Echografie cîrlor urinare, rinichi, vezică urinară , 6.ECG, 7.Analiza urinăi Zemni kii, 8.Analiza Neciporencu, 9.Urocultura 10.Urografie intravenoasă , 11.Cistoure-trografie, 12.Cistoscopia 13.Cistomanometria 14.Ritmul urinării</p>	<p>1</p> <p>2-3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Tratament medicamentos</p> <p><u>Anticolinesterazice</u></p> <p>sol.Neostigmin 0.05% sub cutană sol Galantamini 0.25% sub cutană</p> <p>Kalimin 0.06</p> <p>Neromidină 20mg</p> <p>Neromidină 0,5%</p> <p>Fizioterapie</p> <p>Electroforez sol. Neostigmin 0.05% reg. v. urinare</p>	<p>0.5mg. la 1 an de viață 0.1-0.2ml la 1 an de viață 1compr. x 3ori</p> <p>10 mg × 2 ori 1,0ml × 1-2 ori</p> <p>1 ml</p>	<p>10 fiole</p> <p>10 fiole</p> <p>30 compr.</p> <p>50 compr.</p> <p>10 fiole</p> <p>10 prize</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>21</p> <p>14</p> <p>10</p>