

APROB

DIRECTOR AL IMSP IM și C

_____ **S. GLADUN**

Conduita pacientelor cu metroragie

PROTOCOL CLINIC INSTITUȚIONAL

PENTRU MEDICII SECTIEI GINECOLOGIE

CHISINAU 2017

A. Partea introductivă

A.1	Diagnosticul si manifestari	-Menoragie (menstre abundente cu chiguri sau cu durata > 7 zile). -Metroragie (hemoragii survenite in afara perioadei menstruale). -Menometroragie (hemoragie abndenta prelungita la intervale neregulate). -Hemoragii intermenstruale.
A.2	Codul bolii	N92.0; N92.1; N92.4; N92.5
A.3	Utilizatorii	Secțiile de ginecologie.
A.4	Scopul protocolului	asistența medicală calitativă non-stop, indiferent de timpul internării.
A.5	Data elaborării	MARTIE 2017
A.6	Data revizuirii	MARTIE 2021
A.7	Definiția	Hemoragia reprezinta o singerare anormala exesiva, prelungita sa-u frecventa de origine uterina,
A.8	Elaborat	Sef sectie ginecologie V. Rezneac, Conferenciar universitar V. Ciobanu.
B.Partea generală		
Nivel de asistență medicală spitalicească		
Descriere	Motive	
	Perioada reproductiva Cauze organice: -sarcina ectopica -avort spontan -mola hidatiforma -cauze vulvo-vaginale: traumatice, inflamatorii, infectioase. -cauze cervicale: trauma, eroziune. Cauze functionale: -hemoragii ovulatorii -hemoragii anovulatorii Cauze iatrogene: -contraceptive orale -sterilet -anticoagulante	Perioada menopauzala Cauze organice: -cauze vulvo-vaginale: cancer vulvar, cancer vaginal, vaginita senila. -cauze cervicale: cancer, polip, ulceratie traumatica. -cauze uterine: fibrom, polip, cancer – adenocarcinom, sarcom. -cauze anexiale: cancer ovarian, cancer tubar. Cauze functionale: -hiperplazie de endometru, -atrofie de endometru. Cauze iatrogene: -tratament hormonal substituitiv - anticoagulante
B.1. Diagnosticul -singerare vaginala abundenta, durere hipogastrica, crampe abdominale.		
B.2. Internarea – in sectia de ginecologie -istoric medical -examen clinic general -examen pelvin -ultrasonografie -Grup sanguin Rh.		

-protrombin, fibrinogen -AGS si timpul de coagulare -EKG -la necesitate biochimia		
C. Tratamentul-ciuretaj uterin		
E	Dupa externare	Evidenta la medicul de sector. La necesitate se continua tratamentul ambulator.